

Choléra : Situation du Choléra en Afrique Centrale et de l'Ouest

Situation cumulée à la semaine S52 de 2016

Faits saillants :

30 977 cas


rapportés dont 849 décès soit un taux de létalité moyen de 2.7%.

La grande majorité des cas cette année est fournie par le bassin épidémiologique du fleuve Congo (RDC, RCA et le Congo Brazzaville). Cela représente 92% des cas de la région entière avec plus de 28 000 cas en RDC exclusivement.

Le sud du Bassin du Golfe de Guinée a connu deux grosses flambées avec un foyer au Bénin (874 cas), avec une propagation sur l'état de Lagos au Nigeria. Des cas sporadiques ont aussi été notifiés sur le Togo (Lomé). Le Ghana avec ces 602 cas (Kumasi et Cap Coast) est second foyer dans ce bassin en fin d'année (à partir de la semaine 42)

Les autres pays de la sous région comme le Liberia, la Côte d'Ivoire, et le Cameroun notifient des cas suspects infirmé par laboratoire. Aucun à ce jour n'a donné lieu à l'isolement du *Vibrio cholerae O1*.


La Mauritanie, le Burkina Faso, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali et le Sénégal sont toujours non Choléra en 2016.



Nombre de cas par bassin en 2016



Evolution des cas 2015-2016



Légende

- XXX Nombre de cas reportés et confirmés
- XXX Nombre de décès
- XXX Nombre de cas suspects confirmés négativement par culture en laboratoire
- XXX Nombre de décès

